

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Edition
Cultures Spéciales

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

Supplément N° 38 au Bulletin technique N° 22.

27 Juillet 1994

- EDITION VIGNE 19 -

MILDIOU	: Nouvelle contamination légère le 24 Juillet.
BOTRYTIS	: Premières attaques sur grappes. Situation saine par ailleurs : ne précipitez pas la deuxième intervention.
ACARIENS	: A surveiller de très près : les populations augmentent très rapidement.
VERS DE LA GRAPPE	: Feu vert pour les premières interventions larvicides.
CICADELLES	: En forte recrudescence. Intervenez au seuil de 50 larves pour 100 feuilles.

*** STADES PHENOLOGIQUES ***

Le stade 33, "Fermeture de la Grappe", est généralisé.

Aucune amorce de véraison n'est encore signalée.

*** TOUR D'HORIZON ***

Encore une fois, le week-end a vu se développer des orages accompagnés de pluies très variables selon les secteurs :

- * 0,5 mm à Quincy (18) et Fleury (45)
- * 10 à 15 mm à Amboise et dans le Chinonais (37)
- * 25 à 30 mm dans les secteurs de Oisly et Noyers sur Cher (41)

*** MILDIOU ***

Des amorces de nouvelles taches ont été observées à Gien (45) ; elles font suite aux contaminations du 17 juillet. Ces taches ne fructifient pas.

Une autre contamination légère a été enregistrée dans tous les secteurs soumis à des pluies d'orage conséquentes le 24 Juillet.

Maintenez une protection visant surtout les grappes. Les produits renfermant du cymoxanil ou du cuivre doivent être privilégiés dans les vignes où des taches sont présentes ; dans ces situations, proscrivez l'emploi des spécialités à base d'anilides.

*** BLACK-ROT ***

Situation sans changement.
Nos précédentes préconisations restent valables.

*** OIDIUM ***

A l'exception de Francueil (37), nous n'observons pas de nouvelles attaques sur grappes.

La fermeture de la grappe est dépassée : à partir de maintenant, n'utilisez plus d'I.B.S. pour le contrôle de l'Oïdium et du Black-rot.

direction régionale de l'agriculture et de la forêt

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE
93, rue de Curambourg - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS Cédex

ARBORICULTURE : 250 F
VITICULTURE : 220 F



*** BOTRYTIS ***

Quelques attaques sur grains sont recensées :

- * Francueil, Pocé sur Cisse, St Nicolas de Bourgueil, Vernou sur Brenne (37).
- * Gien (45).

Ces attaques sont limitées à quelques grains totalement atteints, sans extension aux grains voisins. Le temps globalement sec observé actuellement ne favorise pas l'extension de la maladie.

Sur cépages assez peu sensibles au Botrytis, la seconde et dernière intervention peut être différée à la semaine prochaine : il y a peu de risques actuellement.

*** ACARIENS ***

Les populations ont profité du temps chaud pour évoluer très rapidement.

Où les rechercher ?

ACARIENS ROUGES :

Souvent isolés, sur les deux faces de la feuille, sur toute la hauteur du feuillage.

ACARIENS JAUNES :

Plutôt groupés, sur la face inférieure, de préférence dans le bas de la souche ou à partir des "brins de pied".

Si le seuil de 30 % de feuilles occupées par une forme mobile, toutes espèces confondues, est atteint, n'attendez pas pour intervenir, car les populations peuvent doubler en l'espace de quelques jours.

Choisissez le produit que vous utiliserez en fonction des espèces présentes. Reportez-vous à la fiche de détermination et à la liste des produits parues dans notre bulletin N° 7 du 4 Mai dernier.

*** VERS DE LA GRAPPE ***

COCHYLIS :

Le second vol commence à faiblir.

Des jeunes chenilles ont été observées à Francueil et Vernou sur Brenne (37).

EUDEMIS :

Le deuxième vol est toujours aussi intense, notamment à St Nicolas de Bourgueil (37) où 200 papillons ont été piégés en une seule journée, ainsi qu'à Mézières-lez-Cléry (45).

Les interventions strictement larvicides vont pouvoir débuter cette semaine dans les secteurs où Cochylis domine ainsi que les zones les plus précoces à Eudémis, s'il s'agit de la première intervention sur seconde génération.

Si un ovicide a déjà été appliqué, il est prématuré d'envisager le renouvellement de la protection avec un produit larvicide.

*** CICADELLE DES GRILLURES ***

Les jeunes larves ont réalisé des invasions remarquées dans beaucoup de vignobles.

Avec les conditions actuelles, leur pullulation est rapide. En conséquence, ramenez le seuil d'intervention à 50 larves dénombrées pour 100 feuilles observées.

*** DIVERS ***

DESSECHEMENT DE GRAINS :

Il s'agit de baies "chassées" par le grossissement de la grappe. Ne les confondez pas avec une attaque précoce de Black-rot ou de dégâts de Botrytis.